

ES EMERIC HO CLP

MAGAS-OLAJSAVAS NAPRAFORGÓ



ERŐSSÉGEK

STRESSZTŰRÉS ÉS STABILITÁS

JÓ NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI PROFIL

MAGAS OLAJ- ÉS OLAJSAV TARTALOM



NÖVÉNYJELLEMZŐK

ÉRÉSIDŐ

- ✓ Virágzás ideje: középkorai
- ✓ Szemérés ideje: középkorai

MORFOLÓGIA

- ✓ Növénymagasság: közép magas
- ✓ Tányérállás: bókolo

- Nagyon jó alkalmazkodóképessége és erős betegségekkel szembeni ellenállóképessége miatt évről évre stabilan magas és kiszámítható termésszint átlagos vagy gyengébb adottságú termesztési körülmények között is.



TERMESZTÉSI JAVASLAT



TECHNOLÓGIA



MINŐSÉGI MUTATÓK

Átlagos olajtartalom



Átlagos olajsav tartalom



AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődési erély

gyenge

nagyon jó

Szárerősség

gyenge

nagyon jó

Szártó Szkerotínia tolerancia

gyenge

nagyon jó

Tányér Szklerotínia tolerancia

gyenge

nagyon jó

Makrofomina tolerancia

gyenge

nagyon jó

Alternaria tolerancia

gyenge

nagyon jó



VETÉSI JAVASLAT

- Javasolt vetési idő: normál
- Ajánlott vetőmagmennyiség (mag/ha)
 - gyenge adottságú terület: 55-60.000
 - átlagos adottságú terület: 58-62.000
 - jó adottságú terület: 60-65.000
- Milyen termesztési körülmények között javasolt a vetése?
 - gyenge: javasolt
 - átlagos: kifejezetten javasolt
 - jó: javasolt

JEGYZETEK

